

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9301595 - Crau centrale - Crau sèche

| | |
|---|--------------------|
| 1. IDENTIFICATION DU SITE | 1 |
| 2. LOCALISATION DU SITE | 2 |
| 3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES | 4 |
| 4. DESCRIPTION DU SITE | 8 |
| 5. STATUT DE PROTECTION DU SITE | 10 |
| 6. GESTION DU SITE | 10 |

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type B (pSIC/SIC/ZSC) 1.2 Code du site FR9301595 1.3 Appellation du site Crau centrale - Crau sèche

1.4 Date de compilation 31/01/1996 1.5 Date d'actualisation 16/07/2021

1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|--|--|--|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/10/2004
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/01/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021779532

Explication(s) :

MAJ 2009.04 : conversion surf site en Lamb93. Intégration datas bio du DOCOB. # MAJ 2014.08 : actualisation listes, surf et cotations hab esp selon DOCOB (2002) et selon étude récente hab pour révision DOCOB (N.Borel, 2012). Ajout commune Sénas. # MAJ 2021-07 ajout tourterelle des bois

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,82389°

Latitude : 43,57056°

2.2 Superficie totale

31538 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|------------|----------------------------|
| 93 | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |

2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|------------|------------------|----------------|
| 13 | Bouches-du-Rhône | 100 % |

2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|------------|----------------------|
| 13004 | ARLES |
| 13006 | AUREILLE |
| 13035 | EYGUIERES |
| 13039 | FOS-SUR-MER |
| 13044 | GRANS |
| 13047 | ISTRES |
| 13049 | LAMANON |
| 13063 | MIRAMAS |
| 13065 | MOURIES |
| 13097 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU |
| 13103 | SALON-DE-PROVENCE |
| 13105 | SENAS |

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|----|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A B C D | A B C | | |
| | | | | | Représentativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3140 <i>Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.</i> | | 6 (0,02 %) | | M | C | C | B | C |
| 3150 <i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i> | | 4,6 (0,01 %) | | M | C | C | C | C |
| 3170 <i>Mares temporaires méditerranéennes</i> | X | 1,24 (0 %) | | M | C | C | C | C |
| 6220 <i>Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea</i> | X | 8142 (25,82 %) | | M | A | A | A | A |
| 6420 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion</i> | | 13 (0,04 %) | | M | C | C | B | C |
| 6510 <i>Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i> | | 12866 (40,8 %) | | M | A | B | A | A |
| 7210 <i>Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae</i> | X | 2,7 (0,01 %) | | M | D | | | |
| 92A0 <i>Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba</i> | | 208 (0,66 %) | | M | C | C | C | C |
| 92D0 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)</i> | | 1 (0 %) | | M | D | | | |
| 9340 <i>Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia</i> | | 1104 (3,5 %) | | M | B | C | C | C |

- **PF** : Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative** : A = $100 \geq p > 15 \%$; B = $15 \geq p > 2 \%$; C = $2 \geq p > 0 \%$.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Évaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | | |
|--------|------|---|---------------------------------|--------|-----|-------|------|---------------------|---------|------|-------|-------|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A B C | | | |
| | | | | Min | Max | | | | C R V P | Pop. | Cons. | Isol. |
| F | 6147 | Telestes souffia | p | | | i | R | P | C | B | C | C |
| I | 1041 | Oxygastra curtisii | p | | | i | V | DD | C | C | C | C |
| I | 1044 | Coenagrion mercuriale | p | | | i | C | P | C | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus | p | | | i | R | DD | D | | | |
| I | 1088 | Cerambyx cerdo | p | | | i | R | DD | D | | | |
| R | 1220 | Emys orbicularis | p | | | i | R | P | C | B | B | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros | c | | | i | V | DD | C | C | C | C |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | c | | | i | C | P | C | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii | c | | | i | C | P | C | B | C | B |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus | c | | | i | R | DD | C | C | C | C |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii | c | | | i | R | P | C | B | C | C |
| M | 1316 | Myotis capaccinii | c | | | i | R | DD | C | B | C | C |
| M | 1321 | Myotis emarginatus | c | | | i | R | DD | C | B | C | C |
| M | 1324 | Myotis myotis | c | | | i | R | DD | C | B | C | B |

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type** : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population** : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement** : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | | |
|--------|------|---|---------------------------------|-----|-------|------|------------------|---|-------------------|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | | |
| | | | Min | Max | | | IV | V | A | B | C | D | |
| A | | Triturus helveticus | | | i | P | | | | | | | X |
| A | | Pelobates cultripes | | | i | P | X | | X | | X | | |
| A | | Bufo calamita | | | i | P | X | | X | | X | | |
| A | | Hyla meridionalis | | | i | P | X | | X | | X | | |
| B | | Streptopelia turtur | | | | R | | | X | | X | | |
| F | | Anguilla anguilla | | | i | P | | | X | | X | | |
| I | | Coenagrion caerulescens | | | i | P | | | | | | | X |
| I | | Gomphus flavipes | | | i | P | | | X | | X | | |
| I | | Sympetrum pedemontanum | | | i | P | | | | | | | X |
| I | | Sympetrum depressiusculum | | | i | P | | | | | | | X |
| I | | Saga pedo | | | i | P | X | | X | | X | | |
| I | | Prionotropis rhodanica | | | i | P | | | X | X | | | |
| I | | Acmaeodera perroti | | | i | P | | | | X | | | |
| M | | Eptesicus serotinus | | | i | P | | | X | | X | | |
| M | | Myotis nattereri | | | i | P | | | X | | X | | |
| M | | Myotis daubentoni | | | i | P | | | | | | | X |
| M | | Nyctalus leisleri | | | i | P | | | X | | X | | |
| M | | Pipistrellus pipistrellus | | | i | P | | | X | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
| M | | Pipistrellus nathusii | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | Hypsugo savii | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | Plecotus austriacus | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | Tadarida teniotis | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | Pipistrellus kuhlii | | | i | P | | | X | | X | |
| P | | Alisma gramineum | | | i | P | | | | | | X |
| P | | Asplenium sagittatum | | | i | P | | | X | | | |
| P | | Gratiola officinalis | | | i | P | | | | | | X |
| P | | Helianthemum marifolium | | | i | P | | | | | | X |
| P | | Littorella uniflora | | | i | P | | | | | | X |
| P | | Lythrum tribracteatum | | | i | P | | | X | | | |
| P | | Vitis vinifera | | | i | P | | | | | | X |
| R | | Lacerta lepida | | | i | P | | | | | | X |
| R | | Lacerta viridis | | | i | P | X | | | | | X |
| R | | Podarcis muralis | | | i | P | X | | X | | X | |
| R | | Elaphe longissima | | | i | P | X | | | | | X |

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation** : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|--|---------------------------|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 1 % |
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 1 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 4 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 34 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 45 % |
| N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) | 2 % |
| N15 : Autres terres arables | 3 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 1 % |
| N18 : Forêts sempervirentes non résineuses | 2 % |
| N19 : Forêts mixtes | 1 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 1 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 5 % |

Autres caractéristiques du site

La Crau est une vaste plaine formée d'un épandage naturel de cailloutis grossiers, cimentés en un poudingue à quelques centimètres de profondeur.

Vulnérabilité

: Le "coussoul" régresse au profit des cultures intensives. Celles-ci génèrent aussi une pollution de la nappe de Crau, pollution qui se manifeste par la rudéralisation de la végétation des "roubines". L'abandon du pâturage laisse par endroit la dynamique de la végétation s'exprimer, au détriment du coussoul.

De même, la prairie de Crau régresse sous la pression de l'arboriculture. Les travaux des scientifiques ont démontré les relations existant entre la zone steppique de la Crau et la Crau des prairies. Cette interdépendance en ce qui concerne l'économie pastorale apparaît de plus en plus clairement en ce qui concerne les écosystèmes et l'avifaune. C'est donc l'ensemble de ces écosystèmes qui est fragilisé, et l'espace de la Crau doit être géré dans le cadre d'un plan global, intégrant coussouls et prairies, comme deux espaces complémentaires. La vulnérabilité du site est aussi liée aux extensions routières et industrielles, à l'urbanisation et aux extensions d'exploitations agricoles intensives.

4.2 Qualité et importance

La particularité du substrat, associée au climat local et à un pâturage ovin extensif multiséculaire, est à l'origine d'une végétation steppique unique en France, qui s'étend sur le "coussoul". Correspond à un sous type endémique de Crau (6220-5 cahier d'habitats / corine 34.512).

Sur les mêmes terrains, et à proximité des coussouls, des canaux réalisés dès le 16ème siècle amènent l'eau de la Durance et ses alluvions : les limons ont créé peu à peu un sol. C'est sur ce sol que pousse la prairie de Crau.

Accueillant le pâturage ovin d'hiver, complémentaire de celui des coussouls, les prairies, irriguées par submersion, assurent l'essentiel de l'alimentation de la nappe de Crau : les ripisylves des canaux et un réseau dense de haies ont créé un système bocager unique qui abrite une faune spécifique.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i o b] |
| H | D01.02 | Routes, autoroutes | | I |
| H | D02.02 | Canalisations (gaz, pétrole) | | I |
| H | E01.01 | Urbanisation continue | | I |
| H | E01.02 | Urbanisation discontinue | | I |
| H | E02.01 | Usine | | I |
| H | E02.03 | Autres zones industrielles / commerciales | | I |
| H | E03.01 | Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives | | I |
| H | E06 | Autres activités d'urbanisation, industrielles ou similaires | | I |
| H | G05.04 | Vandalisme | | I |
| M | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | I |
| M | A11 | Autres activités agricoles | | I |
| M | C01.01.01 | Carrières de sable et graviers | | I |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i o b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|--|---------------------------|
| Propriété privée (personne physique) | 17 % |
| Propriété d'une association, groupement ou société | 18 % |
| Domaine de l'état | 65 % |

4.5 Documentation

Etudes complémentaires réalisées en 2012 en vue d'actualiser le DOCOB.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|------|--|---------------------------|
| 11 | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 1 % |
| 36 | Réserve naturelle nationale | 23 % |
| 37 | Réserve naturelle volontaire | 2 % |
| 38 | Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique | 1 % |

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|------|----------------------------|------|---------------------------|
| 11 | NEGREIRON | + | 1% |
| 36 | Coussouls de Crau | + | 23% |
| 37 | LA POITEVINE | + | 1% |
| 37 | COUSSOUL DU MAS DE GRAVIER | + | 1% |
| 37 | COUSSOUL DE LA JASSE | + | 1% |
| 37 | COUSSOUL DE GINGINE | + | 1% |
| 38 | APB Le Grand Abondoux | + | 1% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|------|---------------------|------|---------------------------|
|------|---------------------|------|---------------------------|

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Ville de St-Martin-de-Crau

Adresse : Mairie 13310 Saint-Martin-de-Crau

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

Oui Nom : DOCOB N2000
 Lien :

[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/993_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/993_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt)

Non, mais un plan de gestion est en préparation.

Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs validé en 2002, révisé en 2016.